

# КАТАЛОГ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 2021 ПРОДУКЦИИ



Качество, которому доверяют

[www.vivapharm.kz](http://www.vivapharm.kz)

## Рамиприл

Вива Фарм

Таблетки, 5 мг и 10 мг №30



**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество - рамиприл 5 мг или 10 мг

**Показания к применению\*:**

- лечение артериальной гипертензии
- профилактика: снижение сердечно-сосудистого риска и смертности
- диабетическая или недиабетическая нефропатия
- вторичная профилактика после острого инфаркта миокарда (через 48 часов)
- лечение симптоматической сердечной недостаточности

PK-ЛС-3№022394 от 29.08.2019 г.

PK-ЛС-3№022395 от 29.08.2019 г.

## Фозиноприл

Вива Фарм

Таблетки, 10 мг, 20 мг №28



**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество - фозиноприл натрия 10 мг или 20 мг

**Показания к применению\*:**

- артериальная гипертензия
- хроническая сердечная недостаточность

PK-ЛС-5№018185 от 09.08.2019 г.

PK-ЛС-5№018186 от 09.08.2019 г.

## Бисопролол

Вива Фарм

Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг, 5 мг и 10 мг №30



**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество - бисопролола фумарат 2,5 мг, 5 мг или 10 мг

**Показания к применению\*:**

- лечение стабильной ХСН со сниженной систолической функцией левого желудочка, в дополнение к ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и диуретикам, и, возможно, сердечным гликозидам
- артериальная гипертензия
- ишемическая болезнь сердца (стабильная стенокардия)

PK-ЛС-5№022196 от 30.05.2016 г., PK-ЛС-5№022197 от 30.05.2016 г.

PK-ЛС-5№022198 от 30.05.2016 г.

## Кандесартан

Вива Фарм

Таблетки, 8 мг и 16 мг №30



**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество - кандесартана цилексетил 8 мг или 16 мг

**Показания к применению\*:**

- артериальная гипертензия
- хроническая сердечная недостаточность для снижения смертности, частоты госпитализаций по причине ХСН и улучшения симптомов

PK-ЛС-5№024788 от 20.10.2020 г.

PK-ЛС-5№024789 от 20.10.2020 г.

## Каптоприл

Вива Фарм

Таблетки, 25 мг №30



**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество - каптоприл 25 мг

**Показания к применению\*:**

- артериальная гипертензия
- хроническая сердечная недостаточность
- ишемическая болезнь сердца
- диабетическая нефропатия на фоне сахарного диабета I типа, которая проявляется макропротеинурией

PK-ЛС-5№018187 от 04.09.2019 г.

## Каптоприл Н

Вива Фарм

Таблетки, 50мг/25мг №30



**Состав\*:** одна таблетка содержит активные вещества - каптоприл 50 мг, гидрохлортиазид 25 мг

**Показания к применению\*:**

- артериальная гипертензия

PK-ЛС-5№021637 от 28.09.2020 г.

\*Перед назначением и применением препарата ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства

# КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

## Агвистат®

Таблетки, покрытые оболочкой, 5мг/160мг, 10мг/160мг №28



**Состав\*:** Одна таблетка содержит активные вещества – валсартан 160 мг и амлодипина бесилат 6,94 мг или 13,88 мг (в пересчете на амлодипин 5 мг или 10 мг, соответственно)

### Показания к применению\*:

- лечение эссенциальной гипертензии при неэффективности монотерапии

РК-ЛС-5№122148 от 09.10.2019 г.  
РК-ЛС-5№122149 от 09.10.2019 г.

## ВиваКор®

Таблетки, 5/5 мг, 5/10 мг и 10/20 мг, №30 и №28



**Состав\*:** одна таблетка содержит активные вещества – амлодипина бесилат 6,94 мг или 13,88 мг (в пересчете на сухое вещество амлодипин 5 мг или 10 мг), лизиноприла дигидрат 5,44 мг, 10,88 мг или 21,76 мг (в пересчете на сухое вещество лизиноприл 5 мг, 10 мг или 20 мг)

### Показания к применению\*:

- эссенциальная артериальная гипертензия  
- в качестве альтернативы одновременному приему лизиноприла и амлодипина в указанных дозах

РК-ЛС-5№023443 от 28.12.2017 г.  
РК-ЛС-5№023444 от 28.12.2017 г.  
РК-ЛС-5№023445 от 28.12.2017 г.



# ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

## Метилпреднизолон

Вива Фарм

Таблетки, 4 мг и 16 мг №30

**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество – метилпреднизолон 4 мг или 16 мг.

### Показания к применению\*:

Препарат показан для состояний, которые требуют глюкокортикоидной активности, таких как:

#### Эндокринные заболевания

- Первичная и вторичная надпочечниковая недостаточность  
- Врожденная гиперплазия надпочечников

#### Ревматические заболевания

- Ревматоидный артрит  
- Ювенильный ревматоидный артрит  
- Анкилозирующий спондилит  
**Коллагенозы/воспаления артерий**  
- Системная красная волчанка  
- Системный дерматомиозит (полимиозит)  
- Ревматическая лихорадка с тяжелым кардитом  
- Гигантоклеточный артериит/ ревматическая полимиалгия

#### Кожные болезни

- Обыкновенная пузырчатка

#### Аллергические реакции

- Сезонный или круглогодичный аллергический ринит  
- Реакции повышенной чувствительности к лекарственным средствам  
- Сывороточная болезнь

- Аллергический контактный дерматит

- Бронхиальная астма

#### Глазные болезни

- Передний увеит (ирит, иридоциклит)

- Задний увеит; -Оптический неврит



#### Болезни органов дыхания

- Легочный саркоидоз  
- Молниеносный или диссеминированный туберкулез легких (с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией)  
- Аспирация содержимого желудка

#### Гематологические заболевания

- Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура  
- Гемолитическая анемия (аутоиммунная)

#### Онкологические заболевания

- Лейкемия (острая и лимфатическая)

- Злокачественная лимфома

#### Заболевания желудочно-кишечного тракта

- Язвенный колит

- Болезнь Крона

#### Другие показания к применению

- Туберкулезный менингит (в сочетании с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией)

- Трансплантация

РК-ЛС-5№023863 от 23.10.2018 г.

РК-ЛС-5№023864 от 23.10.2018 г.

## Торемифен

Вива Фарм

Таблетки, 20 мг и 60 мг №30

**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество - торемифена цитрат 29,5 мг или 88,5 мг (в пересчете на торемифен 20 мг или 60 мг)

### Показания к применению\*:

Для дозировки 20 мг:

- Лечение гормонозависимого метастатического рака молочной железы в постменопаузе в качестве препарата первой линии.

- Профилактика и лечение дисгормональных гиперплазий молочной железы.

Для дозировки 60 мг:

- Лечение гормонозависимого метастатического рака молочной железы в постменопаузе.

Торемифен не рекомендуется пациентам с эстрогенрецепторнегативными опухолями.



\*Перед назначением и применением препарата ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства

**Фамциклоvir**

Вива Фарм

Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг №10 и 250 мг №21



**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество - фамциклоvir 125 мг или 250 мг

**Показания к применению\*:**

- Инфекции, вызванные вирусом Varicella zoster:
- лечение опоясывающего лишая, включая офтальмогерпес, у взрослых пациентов с нормальным иммунным статусом
  - лечение опоясывающего лишая у взрослых пациентов со сниженным иммунным статусом
- Инфекции, вызванные вирусами Herpes simplex:
- лечение первых проявлений и рецидивов генитального герпеса у взрослых пациентов с нормальным иммунным статусом
  - лечение рецидивов генитального герпеса у взрослых пациентов со сниженным иммунным статусом
  - супрессия рецидивирующего генитального герпеса у взрослых пациентов с нормальным иммунным статусом и у взрослых пациентов со сниженным иммунным статусом

PK-ЛС-3№022356 от 21.08.2019 г.  
PK-ЛС-3№022357 от 21.08.2019 г.

**Энтекаvir**

Вива Фарм

Таблетки, покрытые оболочкой, 0,5 мг №30



**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество - энтекаvir 0.5 мг

**Показания к применению\*:**

- Хронический гепатит В у взрослых с:
- компенсированным поражением печени и наличием вирусной репликации, повышением уровня активности сывороточных трансаминаз (АЛТ или АСТ) и гистологических признаков воспалительного процесса в печени и/или фиброза
  - декомпенсированным поражением печени
- Назначение для компенсированного и декомпенсированного видов поражения печени основано на данных клинических испытаний, проведенного на не принимавших нуклеозиды пациентах с положительным HBeAg и отрицательным HBeAg к ВГВ инфекции, с учетом пациентов с ламивудинрезистентным гепатитом В

PK-ЛС-5№024050 от 15.03.2019 г.

**Валганциклоvir**

Вива Фарм

Таблетки, покрытые оболочкой, 450 мг №60



**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество - валганциклоvira гидрохлорид 496,30 мг (эквивалентно валганциклоvirу 450 мг)

**Показания к применению\*:**

- лечение цитомегаловирусного ретинита у больных СПИДом
- профилактика ЦМВ-инфекции у пациентов группы риска после трансплантации органов

PK-ЛС-5№023377 от 16.11.2017 г.

**Валавекс®**

Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг №10

**Состав\*:** \*: одна таблетка содержит активное вещество - валациклоvira гидрохлорид 556 мг (эквивалентного валациклоvirу 500 мг)

**Показания к применению\*:**

- опоясывающий лишай, вызываемый вирусом Herpes zoster
- инфекции кожи и слизистых оболочек, вызванных ВПГ, включая впервые выявленный и рецидивирующий генитальный герпес
- лабиальный герпес Herpes labialis (губная лихорадка)
- профилактика (супрессия) рецидивов инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса
- супрессивная терапия для снижения инфицирования генитальным герпесом здорового партнера в сочетании с безопасным сексом
- профилактика цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ), возникающей при трансплантации органов.

Профилактическое назначение Валавекса® при ЦМВ инфекции ослабляет выраженность реакции острого отторжения трансплантата (у пациентов с трансплантатами почек), оппортунистических инфекций и других герпесных вирусных инфекций (ВПГ, ВВЗ)

PK-ЛС-5№019443 от 17.07.2020 г.



*\*Перед назначением и применением препарата ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства*

# «ДНЕВНОЙ» ТРАНКВИЛИЗАТОР И СЕЛЕКТИВНЫЙ АНКСИОЛИТИК

## Гидазепам VIC

Таблетки, 20 мг №20, 50 мг №10 и  
сублингвальные таблетки 20 мг №20, 50 мг №10



**Состав\*:** одна таблетка или одна сублингвальная таблетка  
содержит активное вещество – гидазепам 20 мг или 50 мг

### Показания к применению\*:

- при невротических, психопатических астениях
- состояниях, которые сопровождаются тревогой, страхом (в том числе перед хирургическими вмешательствами и болезненными диагностическими обследованиями)
- повышенной раздражительности
- нарушении сна
- эмоциональной лабильности
- также для купирования абстинентного синдрома при алкоголизме и в качестве поддерживающей терапии во время ремиссии при хроническом алкоголизме, при логоневрозах, мигрени

PK-ЛС-5№022914 от 17.04.2017 г.  
PK-ЛС-5№022915 от 17.04.2017 г.  
PK-ЛС-5№022916 от 17.04.2017 г.  
PK-ЛС-5№022917 от 17.04.2017 г.



# ОПИОИДНЫЙ АНАЛЬГЕТИК МОРФИН

## Морфина сульфат VIC

Таблетки, 5 мг №50 или 10 мг №10, №50



**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество - морфина  
сульфата пентагидрат 5 мг или 10 мг

### Показания к применению\*:

- болевой синдром сильной интенсивности

PK-ЛС-5№023132 от 28.07.2017 г.  
PK-ЛС-5№023133 от 28.07.2017 г.



# АНТИГИСТАМИННОЕ СРЕДСТВО

## Дезлор®

Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг №10



**Состав\*:** одна таблетка  
содержит активное вещество - дезлоратадин 5 мг

### Показания к применению\*:

- поллиноз, аллергический ринит (чиханье, выделения из носа, зуд, отек и заложенность носа, а также зуд в глазах, слезотечение и покраснение глаз, зуд в области неба и кашель)
- крапивница (устранения симптомов кожного зуда, сыпи)

PK-ЛС-5№019618 от 19.05.2020 г.

## Цетиризин Вива Фарм

Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг №10, №20



**Состав\*:** одна таблетка  
содержит активное вещество -  
цетиризина дигидрохлорид 10 мг

### Показания к применению\*:

- Для взрослых и детей с 6 лет:
- облегчение назальных и глазных симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита
- облегчение симптомов хронической идиопатической крапивницы

PK-ЛС-5№024666 от 06.08.2020 г.

\*Перед назначением и применением препарата ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства

## НПВС И АНАЛЬГЕТИКИ

### Ибупрофен

Вива Фарм

Таблетки, покрытые оболочкой,  
200 мг №14 и 400 мг №20



**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество - ибупрофен 200 мг или 400 мг

**Показания к применению\*:**

Облегчение боли при следующих состояниях:

- головная и зубная боль
- мигрень
- болезненные менструации
- невралгии
- боли в спине
- мышечные и ревматические боли
- лихорадочное состояние при гриппе и простудных заболеваниях



PK-ЛС-5№122120 от 28.03.2019 г.  
PK-ЛС-5№122119 от 28.03.2019 г.

### Лорноксикам

Вива Фарм

Таблетки, покрытые  
оболочкой,  
4 мг и 8 мг, №10



**Состав\*:** одна таблетка, покрытая оболочкой, содержит активное вещество - лорноксикам 4 мг или 8 мг

**Показания к применению\*:**

- кратковременное лечение болевого синдрома различного происхождения
- симптоматическое лечение боли и воспаления при остеоартрите
- симптоматическое лечение боли и воспаления при ревматоидном артрите

PK-ЛС-5№024267 от 26.08.2019 г.  
PK-ЛС-5№024268 от 26.08.2019 г.

### Ларингал®

Таблетки для рассасывания,  
8.75 мг №10, №20



**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество - флурбипрофен 8.75 мг

**Показания к применению\*:**

- симптоматическое лечение боли в горле при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки



PK-ЛС-5№024286 от 03.09.2019 г.

### Парацетамол Вива Фарм

Суппозитории ректальные,  
80 мг, 150 мг, 300 мг №10



**Состав\*:** один суппозиторий содержит активное вещество – парацетамол 80 мг, 150 мг или 300 мг

**Показания к применению\*:**

- симптоматическое лечение боли от легкой до умеренной интенсивности и/или лихорадочных состояний

PK-ЛС-5№023826 от 11.09.2018 г.  
PK-ЛС-5№023827 от 11.09.2018 г.  
PK-ЛС-5№023828 от 11.09.2018 г.



## ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

### Тилаксин®

Таблетки, покрытые оболочкой,  
125 мг №3, №6, №10



**Состав\*:** одна таблетка содержит активное вещество – тилорон 125,0 мг

**Показания к применению\*:**

- в составе комплексной терапии
- лечение и профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)
- лечение герпетической инфекции

PK-ЛС-5№022890 от 30.03.2017 г.

## РЕГИДРАТАНТ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИЕМА

### ОРС Вива Фарм

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, №20



**Состав\*:** 1 пакет содержит активные вещества - калия хлорида 1.50 г, натрия хлорида 2.60 г, натрия цитрата дигидрата 2.90 г, глюкоза безводная 13.50 г

**Показания к применению\*:**

- потеря жидкости и солей, вызванная острой или хронической диареей

PK-ЛС-5№022967 от 12.05.2017 г.

\*Перед назначением и применением препарата ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства



## ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

### БоксГрипал®

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, №12



**Состав\*:** один пакетик содержит активные вещества - парацетамол 325 мг, фенирамина maleat 20 мг, фенилэфрина гидрохлорид 10 мг

#### Показания к применению\*:

- в качестве проведения кратковременной симптоматической терапии при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе, сопровождающихся высокой температурой, ознобом, лихорадкой, головной болью, явлениями ринита, чиханием и болями в мышцах

PK-ЛС-5№023417 от 08.12.2017 г.

## МУКОЛИТИКИ

### Ацетилцистеин

Вива Фарм

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 200 мг и 600 мг №10, №20



#### Состав\*:

один пакетик содержит (3 г порошка) активное вещество - ацетилцистеин 200 мг или 600 мг

#### Показания к применению\*:

Секретолитическая терапия при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей (бронхов и лёгких), сопровождающиеся нарушением образования и выведения мокроты.

PK-ЛС-5№024132 от 29.05.2019 г.

PK-ЛС-5№024133 от 29.05.2019 г.

### Гриппавив

Капсулы №10



**Состав\*:** одна капсула содержит активные вещества - парацетамол тип DC 208,30 мг (содержит 200,00 мг в пересчете на парацетамол), аскорбиновая кислота тип FC 78,95 мг (содержит 75,00 мг в пересчете на аскорбиновую кислоту), хлорфенамин maleat 2,50 мг

#### Показания к применению\*:

- инфекционно-воспалительные заболевания (ОРВИ, грипп), сопровождающиеся повышенной температурой, ознобом, головной болью, болями в суставах и мышцах, заложенностью носа и болями в горле и пазухах носа, миалгией, артралгией

PK-ЛС-5№023051 от 21.06.2017 г.

## ВИТАМИНЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

### Витамин С + Цинк

Таблетки жевательные №10, №20



**Состав\*:** одна таблетка содержит активные вещества – аскорбиновая кислота 500 мг (в виде аскорбиновой кислоты 200 мг и натрия аскорбата 337 мг)\*, цинк 15 мг (в виде цинка цитрата дигидрата 46,67 мг)

#### Показания к применению\*:

Препарат применяется в профилактических целях, а также в комплексном лечении:

- гипо- и авитаминоза витамина С
- дефицита цинка в организме

PK-ЛС-5№023825 от 11.09.2018 г.

### Витамин С 500

Вива Фарм

Таблетки жевательные, 500 мг №10, №20



**Состав\*:** одна таблетка жевательная содержит активное вещество - кислота аскорбиновая 500 мг (в виде кислоты аскорбиновой 200 мг и натрия аскорбата 337 мг)

#### Показания к применению\*:

- профилактика и лечение цинги, гиповитаминоза и авитаминоза витамина С, состояний повышенной потребности в аскорбиновой кислоте

PK-ЛС-5№018434 от 16.09.2019 г.

\*Перед назначением и применением препарата ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства



[www.vivapharm.kz](http://www.vivapharm.kz)

Адрес организации на территории Республики Казахстан,  
принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств и ответственной  
за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства:  
ТОО «ВИВА ФАРМ», Республика Казахстан, ул. Дегдар, 33, г. Алматы, 050030  
тел.: +7 (727) 383 74 63, факс: +7 (727) 383 74 56 e-mail: [pv@vivapharm.kz](mailto:pv@vivapharm.kz)